Symposium

« BIODIVERSITE - VALORISATION DES SUBSTANCES NATURELLES »

**ACTIVITES ANTIMICROBIENNES DES BACTERIES MARINES ASSOCIEES
A UNE EPONGE BSM1 DU RECIF CORALLIEN DE BELO-SUR-MER
AU SUD OUEST DE MADAGASCAR**

RANISAHARIVONY B.G.^{1,2}, RAJAONARIVELO J. ¹, RAKOTONIRIANA E. F. ¹,
RABEMANANTSOA C. ¹, ANDRIANTSIFERANA M. ²

¹ IMRA Institut Malgache de Recherches Appliquées, Avarabohitra Itaosy BP: 3833

² LPNB Laboratoire de chimie des « Produits Naturels » et Biotechnologie, Université d'Antananarivo

Encadreur

Professeur Marta ANDRIANTSIFERANA

Directeur du Laboratoire de Chimie
des « Produits Naturels » & Biotechnologie
LPNB

Docteur Christian RABEMANANTSOA

Chef du Département de
Biodiversité et Biotechnologie
IMRA

Plan

Introduction

Généralités sur les éponges

Association éponge-microorganismes

Objectifs

Matériels et méthodes

Résultats

Conclusion

Perspectives

1. Introduction

Introduction

Mer: plus de 70% de la surface du globe

**Fond marin et récif corallien: plus riches en biodiversité
que les forêts tropicales humides**

Madagascar: plus de 5000 km de côtes , riche en ressources marines

Éponges: sources de molécules à potentialité pharmaceutique

**Similitude de structure entre les métabolites des éponges et ceux de
leurs microorganismes associés**

Microorganismes : ressource renouvelable

2. Généralités sur les éponges

Généralités sur les éponge

Dotée de pores inhalants et exhalant

Corps composé de spongine et de spicules

Diblastique

Hermaphrodite

La plupart sont marines

Sessile : se fixe **à vie** sur un substrat

Généralités sur les éponge

Classification

Règne	ANIMALIA		
Sous-règne	METAZOAIRE		
Embranchement	SPONGIAIRE ou PORIFERA		
Sous-embranchement	CELLULARIA	SYNCITAL ou SYMPLASIA	
Classe	Calcarea ou Calcisponge	Demospongiae ou Démosponge	Hexactinellida ou Hexactinellide
Sous classe	2	3	2
Ordre	5	13	4
Famille	18	71	19
Genre	63	501	113
Espèce	400-500	14000-15000 dont 4500-5000 répertoriés	450-500

Généralités sur les éponges

Organisation

1. spongocoele ou atrium
2. oscule
3. tube vibratile ou tube radiaire

4. corbeille vibratile
 5. pore inhalant ou ostiole
 6. canal inhalant.
- choanocytes en rouge

Structure des types :asconoïde (A), syconoïde(B) et leuconoïde (C).

Généralités sur les éponges

Mode d'alimentation

- Suspensivores → organismes en suspension
- Hétérotrophes → substances organiques
- Microphages → organismes de petite taille
 - phytoplancton
 - principalement des bactéries
 - 80% des bactéries libres dans l'eau
 - Actinomycètes dans la zone abyssale

Structure histologique d'une éponge de type ascon

3. Association éponge - microorganismes

Association éponge - microorganismes (1)

Association avec des champignons ou des bactéries
(principalement du genre *Pseudomonas* et *Aeromonas*)

Bactéries épibiotiques ou symbiotiques

Eponges: seuls animaux à vivre en symbiose avec des
cyanobactéries [Brusca *et al.*, 2003]

Association éponge - microorganismes (2)

Présence d'une grande quantité de
microorganismes dans la mésoglyée des
éponges [Althoff et *al.*, 1998; Friedrich et *al.*, 1999]

4. Objectifs

Objectifs

Isolement des microorganismes associés aux éponges

Extraction des métabolites secondaires des microorganismes associés

Evaluation de l'activité antimicrobienne des métabolites extraits

5. Matériels et méthodes

Matériels utilisés

Matériel biologique:

Eponge codée BSM1 récoltée à l'ouest de Belo-sur-Mer à 10 m de profondeur en novembre 2007, traitée et stockée à -20°C

Milieux de culture:

Champignons : Sabouraud gélosé à 2% de NaCl + Chloramphénicol

Bactéries : Gélose nutritive à 2% de NaCl + Nystatine

Méthodes

Isolement et identification préliminaires des microorganismes associés à BSM1

Production et extraction des métabolites secondaires des microorganismes associés

Criblage biologique des métabolites secondaires extraits

Isolement des microorganismes associés de BSM1

Désinfection en surface de BSM1 / Alcool 70°

Rinçage 4 fois à l'eau distillée stérile

Découpage stérilement en petits morceaux

Dépôt sur les milieux

Incubation à 25°C

Transfert sur des milieux sans antimicrobienne des microorganismes

Purification des souches

Vérification du procédé de désinfection en surface

Ensemencement en nappe de 100 μ l de la dernière eau de rinçage sur les milieux

Incubation à 25°C pendant 4 semaines

Identification préliminaire

- Observation macroscopique des colonies
(couleur, taille, contour, transparence, relief, aspect et consistance)

- Observation microscopique des microorganismes
 - à l'état frais (mobilité et mode de groupement)
 - Coloration de Gram (couleur, forme et taille des bactéries)
 - mise en évidence des spore (présent ou absent)

- Galerie biochimique
(catalase, métabolisme, respiration, lactase, production de H₂S, nitrate, gélatine, urée....)

Production et extraction de métabolites secondaires

- Production de métabolites secondaires
 - Culture fermentative de 200 ml avec 10^6 ufc/ml de germe.
 - Incubation à 25°C pendant 12 jours à l'obscurité.

- Extraction des métabolites secondaires
 - Séparation de filtrat de culture et de biomasse par centrifugation
 - Ajout 200 ml d'hexane dans le filtrat
 - Macération pendant 24 heures
 - Récupération de la phase hexanique , séchage et pesage
 - Ajout 200ml d'AcOEt dans le reste de phase
 - Macération, récupération de la phase à AcOEt , séchage et pesage

Test antimicrobien

Souches :

Staphylococcus aureus , Gram (+),

Escherichia coli et *Pseudomonas aeruginosa* , Gram (-),

Candida albicans (levure)

Produits à tester :

- Extraits hexaniques
- Extraits à l'AcOEt

Méthode : CCM Bioautographie directe

CCM Bioautographie directe

- Mise au point des CCM (dépôt, développement, révélation des fractions)
- Préparation de l'inoculum (10^6 ufc/ml de germe)
- Ensemencement en nappe de l'inoculum sur le chromatogramme
- Incubation pendant 24 heures à 37°C ou 25°C
- Pulvérisation avec un colorant vital (MTT)
- Observation de la présence de zone d'inhibition (zone claire sur fond violet)

6. Résultats

Résultats

Isolement de microorganismes

27 souches bactériennes au bout de 11 jours

Aucun champignon au bout de 4 semaines

Désinfection en surface

Aucun microorganisme au bout de 4 semaines:

- Microorganismes épibiotiques éliminés
- Bactéries isolées: symbiotiques

Résultats

Identification préliminaires

- 18 souches dont les colonies sont de contour régulier
- Toutes les bactéries: bacilles dont $0,5\mu\text{m} \leq l \leq 1,2\mu\text{m}$ et $0,9\mu\text{m} \leq L \leq 3,3\mu\text{m}$
- 1 bactéries mobile
- 9 (33,3%) bactéries à Gram (-)
- 18 (66,6%) bactéries à Gram (+)
- 7 (26%) bactéries sporulantes
- 20 (74%) bactéries non sporulantes
- 6 (22%) souches appartenant hypothétiquement au genre *Bacillus*
- 21 souches bactériennes réparties en 3 groupes distincts

Résultats

Extraction des métabolites secondaires

A partir des 200 ml de culture fermentative

Extraits hexaniques:

1,6 mg $\leq$ masse $\leq$ 112,2 mg

Extraits à l'AcOEt

8,2 mg $\leq$ masse $\leq$ 231,3 mg

Résultats

Tests antimicrobiens

Tests sur les extraits hexaniques

CCM Bioautographie directe contre *Staphylococcus aureus*

18 souches produisant des métabolites actifs contre *S. aureus*

Aucune activité contre *C. albicans*, *E. coli*, *P. aeruginosa*

Tests sur les extraits à l'AcOEt

CCM Bioautographie directe contre *Staphylococcus aureus*

15 souches produisant des métabolites actifs contre *S. aureus*

Tests sur les extraits à l'AcOEt

CCM Bioautographie directe contre *Candida albicans*

4 Souches produisant des métabolites actifs contre *C. albicans*

Aucune activité contre *E. coli*, *P. aeruginosa*

Résultats

Tests antimicrobiens

Souches les plus productrices de composés actifs: B101, B103, B104, B105

Souches	Gram	Spore	Extrait hexanique		Extrait à l'AcOEt	
			<i>C. albicans</i>	<i>S. aureus</i>	<i>C. albicans</i>	<i>S. aureus</i>
B101	-	-	-	+	+	+
B103	-	-	-	+	+	+++
B104	+	-	-	+	++	+++++
B105	+	+	-	+	+	+++++

Remarque: le nombre de signe + représente le nombre de fractions actives contre la souche pathogène

Résultats

Sur les 27 souches isolées : 20 (74%) productrices de composés actifs dont 16 (59%) contre *S. aureus* uniquement et 4 (15%) contre *S. aureus* et *C. albicans*

Extraits à l'acétate d'éthyle plus actifs que les extraits hexaniques et possèdent plusieurs fractions actives

7. Conclusion

Conclusion

Les 27 souches bactériennes isolées de BSM1 ne représentent qu' une fraction de la totale diversité présente dans l'éponge puisqu'il y a des bactéries qui nécessitent un milieu sélectif

Les résultats sont assez encourageants vu le pourcentage des bactéries ayant une activité antimicrobienne

Les bactéries associées constituent une source potentielle pour le développement d'antibiotique

8. Perspectives

Perspectives

Identification des souches

Tests sur d'autres souches pathogènes

Test d'activité antioxydante

Culture à grande échelle en vue d'isolement et de
détermination de structure des fractions actives

Historique en images

Comité d'organisation de l'ETET_2007 (Morondava)
et le Professeur Luc Abadie, fondateur de l'ETET

Comité d'organisation l'ETET_2007

En co-présidence

Marie-Louise Cariou

René Bally

Gilles Comte

Marta Andriantsiferana

Un des fondateurs des ETETs : Professeur Luc Abadie

Belo-sur-mer

**Première plongée scientifique Financement
GDRI-BDDM : dans les récifs coralliens au large
de Belo-sur-mer avec l'aide de Menabe Plongée**

Les étapes de la collecte

Remerciements

BIODEV/UNESCO

GDRI-BDDM: les Professeurs

René BALLY

Gilles COMTE

Luc ABADIE

CNRE:

LME

Rahanira RALAMBONDRAHETY

MERCI DE VOTRE ATTENTION