Module “Ecologie des sols et des sédiments”

Modification physique du milieu par la faune du sol = Bioturbation

Eric BLANCHART et Tantely RAZAFIMBELO

Institut de recherche
pour le développement

Modification physique du milieu par la faune du sol

1. Structure du sol (rappels)

2. Modification de la porosité

3. Modification de l'agrégation

4. Modélisation

1. Structure du sol

Fonctions (= services écosystémiques) du sol

1. Structure du sol

La structure du sol est le mode d'arrangement des particules du sol dans l'espace et celui des vides qu'elles délimitent

C'est le mode d'assemblage qui détermine les **propriétés physiques**

Composition et structure du sol

1. Structure du sol

Principaux paramètres de caractérisation physique du sol

SCHEMA DE SYMBOLISATION DU SYSTEME TRIPHASE SOL.

PARAMETRE	SYMBOLES			Définition (3)	Relation avec autres paramètres
	Français(1)	S.I. (2)	autre		
Masse volumique de l'eau		γ_w		Me/Ve	
Masse volumique du solide		γ_s		Ms/Vs	
Masse volumique apparente		γ_h		Mt/Vt	
Masse volumique sèche		γ_d		Ms/Vt	
Densité réelle	D, dr	ρ_s		γ_s / γ_w	
Densité apparente humide	da h	ρ_h		$\gamma_h / \gamma_w = Mt / (Vt \cdot \gamma_w)$	$(Ms+Me) / (Vt \cdot \gamma_w)$
Densité apparente (sèche)	d, da, das	ρ_d		$\gamma_d / \gamma_w = Ms / (Vt \cdot \gamma_w)$	
Porosité	P	n	f	Vv/Vt	$1 - (\rho_d/\rho_s)$
Indice des vides	Iv	e		Vv/Vs	$n/(1-n)$
Teneur en eau massique (humidité pondérale)	H, Hp	w		Me/Ms	
Teneur en eau volumique (humidité volumique)	Hv	θ		Ve/Vt	$w \cdot \rho_d$
Degré de saturation (en eau)		Sr	θ_s	Ve/Vv	θ/n
Teneur en air		ϵ	fa	Va/Vt	$n - \theta$

1. Structure du sol

Importance agronomique : l'agencement des particules définit des pores de taille et interconnexion variée, dont la **disponibilité de l'eau et de l'air** pour les plantes et les microorganismes et les possibilités de pénétration par les racines

Importance environnementale : une bonne structure permet **l'infiltration** de l'eau donc limite le ruissellement et **l'érosion** (pertes en terre, coulées boueuses), qualité des eaux superficielles

1. Structure du sol

Importance de la structure du sol:

une pénétration
aisée des racines
*ancrage,
colonisation*

des macro-pores assurant:
- drainage
- aération
respiration des racines

des micro-pores remplis d'eau
eau, éléments nutritifs

- Habitat des racines et des microorganismes auxilliaires
- Élément de la **qualité physique** des sols

1. Structure du sol

Les types de structure

- Particulaire, massive, agrégée
- Agrégat =
 - ensemble de particules du sol entre lesquelles les forces de cohésion sont plus élevées qu'avec les particules adjacentes
 - microagrégats ($< 0,2$ mm) et macroagrégats ($> 0,2$ mm)
- La structure agrégée a une organisation hiérarchique ou fractale (parfois ?)

1. Structure du sol

Différents types de structure et conséquences pour l'infiltration

Rapid

Moderate

Slow

Rapid

Moderate

Slow

1. Structure du sol

Différents types de structure

1. Structure du sol

Caractérisation de la structure

Les pleins : agrégation

Les vides : porosité (densité apparente, spectre poral)

L' eau dans le sol (infiltration, perméabilité, conductivité hydraulique, réserve en eau utile, caractéristiques hydrostructurales)

La stabilité de la structure (de l' agrégation)

1. Structure du sol

Echelle des constituants et organisations du sol

Echelle (m)	Particules	Organismes vivants et MO	Organisations	Porosité
10^{-10}	Atomes		Etat cristallin, minéraux amorphes	Micropores Eau adsorbée, intracristalline
10^{-9} nm	Molécules	Molécules organiques		
10^{-8}	Macromolécules	Polysaccharides		
10^{-7}	Colloïdes	Substances humiques		
10^{-6} μ m	Particules d'argile 0.002 m	Virus Bactéries	Particules d'argile tactoïdes, domaines	Mésopores (eau utile) (capillarité)
10^{-3}	Limons 0.05 mm	Hyphes, levures	Assemblages argile microagrégats	Macropores
10^{-4}	Sables	Poils absorbants racines		Pores de drainage et d'aération
10^{-3} mm	2 mm Graviers	mésafaune	macroagrégats	
10^{-2} cm		Vers de terre		
10^{-1} dm		Taupes	Mottes (horizons)	
1 m		Blaireaux...	(Horizons, profils)	

1. Structure du sol

Les vides du sol = pores

Les pores sont les vides du sol. Important car l'eau et l'air se déplacent à l'intérieur et y sont stockés.

Sans air, la plupart des organismes du sol (dont les racines) ne pourraient pas vivre

Les types de pores

Pores interstitiels : espaces entre les grains minéraux et les agrégats

Pores tubulaires : pores faits par l'activité des racines et des animaux (continus)

Pores vésiculaires : pores en forme de bulles

Les tailles de pores

Macropores : permet le mouvement libre de l'eau et de l'air

Micropores : mouvement de l'air grandement perturbé, mouvement de l'eau réduit au flux capillaire

1. Structure du sol

Forme des macropores / propriétés fonctionnelles

vides d'entassement d'agrégats

- stockage d'eau, aération
- conductivité f^2 des rayons de constriction

vides tubulaires

- conductivité f^4 du ϕ
 - . de la tortuosité
 - . de leur longueur
- non affectés par le retrait/gonflement

vides planaires

- dynamiques en f^2 des conditions d'humectation
- grande continuité
- conductivité f^2 de l'orientation

1. Structure du sol

Mesure de l'agrégation (désagrégation)

Matrice du sol

dispersion complète

dispersion ménagée

*fractionnement d'unités
structurales*

Associations organo-
minérales secondaires

sables

limons

argiles

< 2 μm

*fractionnement granulométrique et
densimétrique de particules*

- Particules élémentaires du sol
- Associations organo-minérales "primaires"

1. Structure du sol

Test de stabilité structurale à l'eau

1. Structure du sol

Mécanismes de désagrégation de la structure par l'eau

1. Structure du sol

Désagrégation par la pluie (érosion)

1. Structure du sol

La stabilité de l'agrégation est une mesure commune de la qualité d'un sol

- **Influencée par :**

- Matière organique et organismes
- Texture
- Rotation
- Travail du sol

- **Importante pour :**

- Aération
- Relations hydriques
- Productivité

1. Structure du sol

Facteurs influençant l'agrégation et sa stabilité

Agrégats maintenus
grâce à :

- hyphes fongiques
- « colles » bactériennes
- matière organique
- cations

1. Structure du sol

La protection physique des MOS

MO physiquement protégée
contre la biodégradation par
la matrice solide du sol

accessibilité des microorganismes
disponibilité O₂

déprotection
travail du sol, désagrégation par la pluie ...

1. Structure du sol

Facteurs influençant la structure du sol

1. Structure du sol

Processus biologiques de structuration des sols

Processus directs :

Formation de pores :

- Racines, vers de terre, larves d' insectes, taupes...

Formation d' agrégats :

- Déjections de la faune : turricules de vers de terre, pelotes fécales de la microfaune

Processus indirects :

Formation de fissures et de zones compactées :

- compactage mécanique autour des racines, hyphes
- prélèvement local d' eau par les racines

1. Structure du sol

Processus biologiques de stabilisation de la structure des sols

Importance des matières organiques et de l'activité biologique dans la genèse et la stabilité de la structure

Effet d'apports organiques, de certains modes d'occupation des sols (prairies)

Corrélations :

Stabilité de la structure <----> C

Polysaccharides totaux, eau chaude

Longueur de racines

Longueur d'hyphe

Biomasse microbienne

1. Structure du sol

L' effet des vers de terre

1. Structure du sol

Classification des vers de terre : les catégories écologiques

Epigés
Anéciques
Endogés

2. Modification de la porosité

2. Modification de la porosité

2. Modification de la porosité

**TOMOGRAPHIE
AUX
RAYONS X**

**Carotte de sol
"naturelle" ou artificielle**

*** algorithme de
segmentation
(local et évolutif)**

2. Modification de la porosité

Typologie des réseaux lombriciens

reconstitution 3D : terrain

Réseaux naturels (complexes)

Colonne de terrain
(25 cm x 50 cm)

Reconstitution 3D
en volume

Reconstitution 3D
en squelette

Reconstitution 3D
cailloux

2. Modification de la porosité

Typologie des réseaux lombriciens

reconstitution 3D : laboratoire

Galeries individuelles (durée = 1 mois)

2. Modification de la porosité

Colonnes « artificielles »

A. nocturna

(2 individus ; 1 mois)

A. chlorotica

(4 individus ; 1 mois)

Both species

(2 chloro+ 1 nocturna)

Diamètre = 16 cm

Hauteur = 30 cm

2. Modification de la porosité

“COLONNE GAMMA”

- * plateau oscillant portant 3 scintillateurs
- * animal marqué au ^{60}Co dans une colonne de terre

2. Modification de la porosité

Principe

intensité du signal

creusement et utilisation du réseau

- fréquence de passage
- temps de résidence

étude dynamique des impacts

2. Modification de la porosité

A. nocturna

L. terrestris

A. chlorotica

N. giardi

Phases :

2. Modification de la porosité

Galleries

Porosité relative
(/ témoin) ◆

Biostructures

◆ Eléments figurés > 1mm
(% surface totale)

Cette augmentation de biomasse lombricienne anécique se traduit par une augmentation des activités de bioturbation, associées à la création de porosité globale et de mésoporosité d'assemblage (déjections)

2. Modification de la porosité

Galleries

N. giardi

(longueur totale x4)
(Nb galeries x3)
(Nb Ramification x 0.33)

Verticales et horizontales

Volume / volume total
de la colonne en %)

L. terrestris

Verticales

Orientation
des galeries

2. Modification de la porosité

Galleries

N. giardi

1 cm

Faible cutane
et malgré une compression à la création,
pas de diminution de la porosité des parois

L. terrestris

Formation d'épaisses cutanes,
entraînant une diminution
de la porosité des parois

2. Modification de la porosité

Galleries

Conséquences sur la circulation de Carbone Organique Dissous (galeries d'anéciques)

Flux de COD : 2 fois plus importants en présence des 2 espèces

2. Modification de la porosité

Effets des vers de terre sur les propriétés du sol

3. Modification de l'agrégation

3. Modification de l'agrégation

Facteurs influençant la structure du sol

Pédotubule recoupant une structure sédimentaire

3. Modification de l'agrégation

Effet de la densité apparente sur la production de turricules

3. Modification de l'agrégation

Production de turricules : individus

Les vers de terre consomment et rejettent de grandes quantités de sol

3. Modification de l'agrégation

Production de turricules : peuplements

Watanabe & Ruaysoongnern, 1984 ; Lavelle, 1978 ; Blanchart et al., 1999 ; Bouché & Al Addan, 1997

8 à 10 cm de sol passent chaque année par le tube digestif des vers de terre

3. Modification de l'agrégation

Propriétés des turricules

texture plus fine

3. Modification de l'agrégation

Propriétés des turricules

structure plus compacte

Densité apparente (g/cm^3)

3. Modification de l'agrégation

Propriétés des turricules

Soil thin section
surface (%)

Age des turricules (séchés à l'air)

3. Modification de l'agrégation

Propriétés des turricules

stabilité plus élevée

% agrégats stables

3. Modification de l'agrégation

Propriétés des turricules

présence d'un cortex

3. Modification de l'agrégation

Formation de la structure du sol

Sols à argile 1:1

8 cm

Sans vers de terre

Avec grands vers de terre

30 mois d'expérience

Blanchart, 1992

Les vers de terre sont responsables de la formation de la structure des sols observée

3. Modification de l'agrégation

Conservation de la structure du sol

Sols à argile 1:1

28 mois d'expérience

Blanchart et al, 1997

Les vers de terre sont responsables du maintien de la structure des sols observée (agrégation, porosité, stabilité)

3. Modification de l'agrégation

Conservation de la structure du sol

Sols à argile 1:1

➔ **Groupes fonctionnels de vers de terre**

Blanchart et al., 1997

La conservation de la structure du sol est le résultat d'actions antagonistes entre les organismes compactants et les organismes décompactants

3. Modification de l'agrégation

Distribution spatiale des compactants et des décompactants

Zones de fortes densités (savane de Lamto)

Densité du ver de terre décompactant *Chuniodrillus zielae*

Densité du ver de terre compactant *Millsonia anomala*

3. Modification de l'agrégation

Effets compactants / décompactants Lamto (Côte d'Ivoire) - Expérience en pots

Bulk density
(g/cm³)

3. Modification de l'agrégation

Problèmes liés au développement des compactants

Biomasse de vers

Densité apparente

Croûte continue de turricules
Hydromorphie, émission de CH₄

- « Accidents de biodiversité »
Déséquilibre dans la diversité fonctionnelle

3. Modification de l'agrégation

Problèmes liés au développement des compactants

Hydromorphia developed
in depth along drainage
cracks

Ca. 6t ha⁻¹ C lost, probably
as CH₄ emissions

Espèce compactante
(*P. corethrus*)

3. Modification de l'agrégation

Problèmes liés au développement des compactants

Turricules de vers de terre sous
forêt

L=2,52 cm ; lame mince scannée, lumière
transmise

Agrégation sous pâturage (Pah)
L=3,6 cm ; lame mince scannée, lumière transmise

3. Modification de l'agrégation

Problèmes liés au développement des compactants

3. Modification de l'agrégation

Conséquences sur les propriétés physiques

Taux d'infiltration
(ml 2mn⁻¹)

No = sans vers de terre
S1 = *Hyperiodrilus africanus*
S2 = Eudrilidae
L = *Millsonia anomala*

3. Modification de l'agrégation

Conséquences sur les propriétés physiques

Rétention en eau du sol
MA = *Millsonia anomala*
Co = faune totale
NE = sans vers
EU = petits *Eudrilidae*

Stabilité structurale
du sol

3. Modification de l'agrégation

Effet des vers de terre sur la densité apparente du sol
Yurimaguas (Pérou) - Sol cultivé

Densité
apparente
(g/cm³)

3. Modification de l'agrégation

Activités des vers de terre et érosion Processus / Conséquences

3. Modification de l'agrégation

Production de turricules à la surface du sol Côte d'Ivoire - Forêt

Soil quantity (Mg/ha/year)

3. Modification de l'agrégation

Groupes fonctionnels et érosion

Epigés : Faible influence sur l'érosion

**Anéciques : abondants dans les régions tempérées.
Formation de galeries larges, verticales et continues.
Effets sur l'infiltration**

**Endogés : dominants dans les tropiques. Intense
production d'agrégats**

3. Modification de l'agrégation

Groupes fonctionnels et érosion

Sols à kaolinite :

FORT potentiel de l'activité des vers de terre pour réduire l'érosion.

Forte interaction avec la matière organique

Sols à smectite :

FAIBLE potentiel de l'activité des vers de terre pour réduire l'érosion.

3. Modification de l'agrégation

Facteurs influençant la structure du sol

Conclusions :

La faune du sol participe activement à la formation et à la conservation de la structure des sols

L'amplitude de l'effet dépend de l'environnement (climat, type de sol, végétation) et des espèces impliquées

La présence d'une diversité fonctionnelle équilibrée est un gage de la conservation d'une bonne structure

Des changements dans la faune du sol ont des conséquences immédiates sur la structure et le fonctionnement physique du sol

4. Modélisation

SWORM: un modèle multi-agents pour simuler l'effet des vers de terre sur la structure du sol

Eric Blanchart, N. Marilleau, C. Cambier, A. Drogoul, E. Perrier, J.L. Chotte

4. Modélisation

Quel modèle ?

Modéliser l'environnement (sol) = une grille de cellules

Agents autonomes (vers de terre) capables de se déplacer, d'interagir et de modifier l'état des cellules

4. Modélisation

1ère difficulté : décrire *l'environnement physique*

Un sol est un milieu hétérogène, multi-échelles,
en 3 dimensions et dynamique

2ème difficulté : décrire *le comportement des VDT*

- VDT interagissent avec le sol (perception)
- Comportements ingestion/déjection
- Déplacements

4. Modélisation

Sol = environnement dynamique et multi-échelles

Approche Agent Pore Solid Fractal (APSF)

Patterns = Canevas pour caractériser l'organisation spatiale des cellules

Canvas 0

Canvas 1

Canvas 2

Canvas 3

Virtual environment

Canevas associés par un arbre
(exemple d'un arbre)

4. Modélisation

Simulateur

Décrit le fonctionnement du sol dans un bloc de 20 x 20 x 20 cm

La taille de chaque cellule est divisée par 10

Taille :

20 mm au niveau 0	
2 mm au niveau 1	→ Sand
0.2 mm au niveau 2	→ Fine sand
0.02 mm au niveau 3	→ Fine silt
0.002 mm au niveau 4	→ Clay

Propriétés du sol nécessaires : teneur en MO, texture, densité apparente, densité réelle

Vers de terre: nombre d'espèces, taille moyenne (diamètre), abondance, consommation journalière, taux d'assimilation, sélection de particules

Turricules: teneur en MO, texture, densité apparente

Sorties: Animations, vues 3D, lames minces, évolution de paramètres

4. Modélisation

Vers de terre

	M. anomala	Eudrilidae
Scale	2 mm	2 mm
Number of simulated worms	20	200
Soil ingested per day per individual	20 g	500 mg
Assimilation rate	9%	9%
Particle selectivity	90%	60%

***Jour simulé:* 10 périodes d'ingestion alternant avec 10 périodes de rejet**

***Simulation:* 40 jours**

4. Modélisation

Lames minces de sol

- Cast
- Solid
- Pore

Initial soil structure

40 days

Millsonia anomala

- Decomposable
- Solid
- Pore

- Decomposable
- Cast
- Solid
- Pore

Eudrilidae

FIN